

Capsidol crema

Oleoresina de Cápsico
Analgésico Tópico Externo

COMPOSICIÓN

Oleoresina de Cápsico (expresada en Capsaicina)0,025 g
Excipientes (miristato de isopropilo, ácido esteárico,
propilenglicol, monomiristato de glicerina, dietanolamina
cetil fosfato, alcohol cetílico, alcohol bencílico,
diazolidinilurea, p-hidroxibenzoato de metilo sódico,
p-hidroxibenzoato de propilo, agua purificada), c.s.p. 100,- g

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Crema.

Tubos con 30 gramos y 60 gramos.

ACTIVIDAD

La oleoresina de cápsico se obtiene de los frutos de las variedades picantes del Cápsico o guindilla.

Su aplicación tópica produce una sensación transitoria de ardor (acción rubefaciente), seguida de una progresiva disminución del dolor localizado en la piel y tejidos subyacentes al lugar de aplicación.

TITULAR Y FABRICANTE

Laboratorios Viñas, S.A. - Provenza, 386 - 08025 Barcelona

INDICACIONES

Alivio sintomático de dolores musculares o articulares localizados.

CONTRAINDICACIONES

Esta especialidad es de uso exclusivamente tópico, y debe evitarse su aplicación sobre la piel irritada, quemada o herida, así como sobre ojos y mucosas.

Antecedentes de alergia a sus componentes.

PRECAUCIONES

Si los dolores persisten más de 7 días o empeoran, o se produce irritación o enrojecimiento, consultar al médico.

No aplicar calor ni vendajes apretados.

No utilizar de forma prolongada ni en áreas extensas.

INTERACCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS

Embarazo y lactancia : No se han descrito por vía tópica dermatológica.

Efectos sobre la capacidad de conducción : No altera la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria.

Uso en niños : No utilizar en niños menores de 2 años.

En el caso de persistencia o agravación de los síntomas tratados, se consultará al médico.

POSOLOGÍA e INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

Crema de **uso exclusivamente local, sobre la piel**. Aplicar una fina capa de producto sobre la zona afectada, extendiéndola suavemente. Repetir la aplicación 3 ó 4 veces cada día.

Conviene lavarse las manos con agua fría y jabón inmediatamente después de cada aplicación, así como evitar el contacto del producto con ojos y mucosas.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, ingestión accidental o contacto con los ojos, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS

El principal efecto secundario descrito es la reacción de ardor inicial que se produce tras la aplicación del producto. Esta reacción suele disminuir con el tiempo a medida que prosigue el tratamiento, a la dosis recomendada. En algunas personas, reacciones alérgicas (quemazón o picor). En este caso suspender el tratamiento.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TEXTO REVISADO : Diciembre 1995



Director Técnico, A. Buxadé Viñas

Laboratorios Viñas sa

Provenza, 386 - 08025 Barcelona