

TARMED

Coaltar

COMPOSICIÓN

Por 100 g:

Solución de coaltar.....4 g

Excipientes: Lauril éter sulfato sódico, cocamidopropil betaina, hidrógeno fosfato disódico, ácido cítrico monohidratado, alcohol bencílico, PEG 150 diestearato, hexilen glicol, alcohol oléico, poliquaternium 10, fragancia AF17050, agua purificada c.s.p.....100 g

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Champú que se presenta en frascos de 150 ml.

ACTIVIDAD

Tarmed contiene como ingrediente activo coaltar, que actúa sobre las alteraciones descamativas del cuero cabelludo, y está formulado sobre una base de champú con limpiadores suaves, un polímero acondicionador y un pH adecuado para que deje el cabello flexible y brillante.

TITULAR Y FABRICANTE

TITULAR

Stiefel Farma, S.A.

P.T.M. C/ Severo Ochoa, 2

28760 Tres Cantos (Madrid)

REPRESENTANTE LOCAL:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A.

P.T.M. C/ Severo Ochoa, 2

28760 Tres Cantos (Madrid)

FABRICANTE

Laboratorios Stiefel Irlanda

Finisklin Industrial Estate

Sligo (Irlanda)

INDICACIONES

Tarmed está indicado para el alivio sintomático de las alteraciones capilares descamativas, tales como: dermatitis seborreica, psoriasisiforme, caspa y picor del cuero cabelludo.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Evitar el contacto con los ojos. Tarmed es sólo para uso externo sobre el cabello.

INTERACCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS

Uso en embarazo y lactancia

Los champús de alquitrán se han empleado ampliamente durante años sin aparentes consecuencias adversas. No obstante, no se ha establecido la seguridad del uso de Tarmed Champú en el embarazo y/o lactancia.

Efectos del tratamiento sobre la capacidad de conducción

No se han descrito.

POSOLOGÍA

Aplicación tópica sobre cuero cabelludo.

Debe utilizarse una o dos veces por semana.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Humedecer bien el cabello y aplicar Tarmed champú en cantidad suficiente para producir espuma abundante. Aplicar un suave masaje con la yema de los dedos sobre el cuero cabelludo. Aclarar bien con agua. Repetir la aplicación y aclarar de nuevo.

SOBREDOSIS

En caso de ingestión podría causar náuseas y vómitos. Acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS

Podría ocasionalmente causar irritación, erupción y raramente fotosensibilidad en la piel. Si apareciera alguno de estos síntomas, interrumpir el tratamiento y consultar con su médico.

Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperaturas inferiores a 25°C.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

“Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños”

TEXTO REVISADO

Octubre 1996

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>