

## **Prospecto: información para el usuario**

### **SUPOSITORIOS DE GLICERINA MICRALAX LACTANTES**

Glicerol

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días.

#### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes.
3. Cómo usar Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes.
6. Contenido del envase e información adicional.

#### **1. Qué es Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes y para qué se utiliza**

El glicerol, principio activo de este medicamento, es un laxante que se administra por vía rectal. El efecto laxante se consigue por la capacidad del glicerol de ablandar las heces que, junto a una ligera acción irritante local, consigue estimular los movimientos del intestino.

Está indicado para el alivio sintomático del estreñimiento transitorio y ocasional para niños menores de 2 años.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días.

#### **2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes**

##### **No use Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes**

- Si es alérgico al glicerol o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en el apartado 6).
- Si padece algún tipo de enfermedad anorectal, rectocolitis hemorrágica (un tipo de inflamación crónica del intestino) y hemorroides inflamadas. Si tiene retortijones, cólicos, náuseas, vómitos u otros signos de apendicitis, obstrucción intestinal, enfermedades intestinales inflamatorias agudas o, en general, cualquier situación de dolor abdominal, sin conocer la causa que los produce
- En niños.

##### **Advertencias y precauciones**

En caso de la aparición de sangre en heces, irritación, dolor o que no mejora, debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

No use este medicamento más de 7 días seguidos, salvo que su médico se lo indique.

Este medicamento se utilizará únicamente bajo estricto control médico, en pacientes con enfermedades graves, especialmente, cardiovasculares (relativas al corazón o a los vasos sanguíneos).

### **Interacción de Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes con otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Debido al tipo de medicamento del que se trata y a su vía de administración, no afecta al uso de otros medicamentos.

### **Embarazo y lactancia**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

### **Conducción y uso de máquinas**

El uso de este medicamento no afecta a la capacidad para conducir y/o utilizar máquinas.

## **3 Cómo usar Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es de 1 supositorio al día, cuando sea necesario, o según la prescripción del médico.

### **Forma de administración**

Tras sacar el supositorio del blister, introduzca el supositorio profundamente en el recto. Reprima la evacuación lo máximo posible con el fin de que el medicamento pueda ejercer su acción.

No se debe utilizar el medicamento durante más de 7 días seguidos. Si los síntomas no mejoran debe suspender el tratamiento y consultar al médico.

### **Si usa más Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes del que debe**

No es probable que se produzcan cuadros de intoxicación debido a su uso.

El uso abusivo y prolongado de este medicamento puede dar lugar a un síndrome de colon irritable (síntomas o molestias como alternancia del estreñimiento y de la diarrea, espasmos intestinales, hinchazón, náuseas y gases).

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico, farmacéutico o llame el Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20 (indicando el medicamento y la cantidad ingerida).

## **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el periodo de utilización de Glicerol por vía rectal como laxante, se han observado los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud: irritación, dolor, escozor o picor anal.


Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

## **5. Conservación de Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, después de “CAD”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto Sigre  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

## **6. Contenido del envase e información adicional**

### **Composición de Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes**

- El principio activo es 900 mg de glicerol por cada supositorio.
- Los demás componentes (excipientes) son: Estearato sódico y Carbonato sódico.

### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Supositorios de Glicerina Micralax Lactantes se presentan en envases que contienen 12 supositorios.

### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

#### **Titular:**

Johnson & Johnson S.A.  
Paseo de las Doce Estrellas 5-7  
28042 Madrid

#### **Responsable de la fabricación:**

FARMEA  
10 rue Bouché Thomas  
ZAC d'Orgemont  
49000 Angers (FRANCIA)

**La última revisión de este prospecto fue en Noviembre 2011.**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.