

BICARBONATO DE SOSA TORRES MUÑOZ COMPRIMIDOS

COMPOSICION:

Bicarbonato sódico puro 500 mg, por comprimido. Excipientes: Celulosa microcristalina, Talco.

PROPIEDADES:

El Bicarbonato sódico es un antiácido con actividad neutralizante del exceso de ácido en el estómago.

TITULAR Y FABRICANTE:

Titular:

Novartis Consumer Health S.A.
Gran Via de les Corts Catalanes, 764
08013 Barcelona-España

Fabricado por:

Farmasierra Manufacturing, S.L.
Crtra. De Irún Km, 26. 28700
San Sebastián de los Reyes (Madrid)

INDICACIONES:

Alivio sintomático de las molestias estomacales relacionadas con hiperacidez (acidez de estómago, ardores).

POSOLOGIA:

Adultos: De dos a cuatro comprimidos tomados con un poco de agua de 20 minutos a 1 hora después de las principales comidas. No tomar más de 2 dosis al día. Niños: Consultar al médico

CONTRAINDICACIONES:

Consulte a su médico si padece hipertensión, insuficiencia cardíaca o renal, está embarazada, tiene propensión a la retención de agua (edemas), o en general, si está siguiendo un tratamiento con diuréticos o una dieta con poca sal.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Riesgo de retención de agua (edema). Flatulencia y eructos.

INTERACCIONES:

Consulte a su médico si se encuentra tomando otra medicación, porque los antiácidos pueden modificar la acción de otros medicamentos (tetraciclinas, anfetaminas, quinidina, carbonato de litio, sales de hierro). No tomarlo con leche o calcio.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES:

No utilizarlo más de 2 semanas sin consultar al médico.

Advertencias sobre excipientes

Este medicamento por contener 137 mg de sodio por comprimidos, puede ser perjudicial en pacientes con dietas pobres en sodio.

IMPORTANTE PARA LA MUJER:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

SINTOMATOLOGIA DE INTOXICACION Y TRATAMIENTO:

A grandes dosis o tratamientos continuados: Alcalosis metabólica, que se manifiesta con los siguientes síntomas: debilidad, ansiedad, dolor de cabeza, vómitos, pérdida de apetito. Interrumpir la medicación y consultar al médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica (Teléfono: 91-562.04.20) indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Vía oral

“Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños”.

Sin receta médica.

Protéjase de la humedad.