

Nebulicina® Adultos

Oximetazolina

Composición

Cada 100 ml contienen:

Hidrocloruro de oximetazolina 50 mg

Excipientes: Glicina, sorbitol (E 420), cloruro de benzalconio, hidróxido de sodio, agua purificada c.s.

Indicaciones

Alivio local sintomático de la congestión nasal.

Posología y Normas para su Correcta Administración

Adultos y niños mayores de 12 años: 2 pulverizaciones en cada fosa nasal, 2 veces al día.

La pulverización se logra introduciendo la cánula en cada fosa nasal; luego se aprieta el envase en forma enérgica y rápida, retirándolo sin haber disminuido la presión.

Los envases de Nebulicina pueden ser utilizados no sólo como pulverizadores, sino también como cuentagotas, en cuyo caso las dosis serán de 2 gotas en cada fosa nasal 2 veces al día.

Contraindicaciones

Niños menores de 6 años.

Historial de hipersensibilidad a la oximetazolina o descongestionantes adrenérgicos.

Precauciones y advertencias especiales

En casos muy raros, el medicamento aumenta los síntomas de congestión nasal en lugar de disminuirlos. Si ocurre esto, consulte a su médico.

No lo use más de tres días seguidos sin prescripción médica.

Consulte al médico antes de utilizar el medicamento si padece diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad del tiroides o si está tomando medicamentos contra la depresión o medicamentos contra el asma del tipo denominado "broncodilatadores adrenérgicos".

Si aparece insomnio, lo cual es raro, procure evitar tomar el medicamento a última hora de la tarde o por la noche.

No exceder la dosis recomendada.

No usar durante el embarazo sin consultar a su médico.

El uso del pulverizador o del cuentagotas, por más de una persona, puede dar lugar a contagios.

Incompatibilidades e interacciones

No administrar conjuntamente con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) o antidepresivos tricíclicos.

Efectos secundarios

Puede aparecer escozor, sequedad o picazón de la mucosa nasal, estornudos, generalmente sin importancia.

Los siguientes síntomas suelen producirse cuando se toman dosis excesivas: dolor de cabeza, temblor, insomnio, sudoración excesiva, palpitaciones del corazón, nerviosismo no usual. Si aparecen, reduzca la dosis. Si tiene dudas sobre la dosificación correcta consulte a su médico o a su farmacéutico.

El uso excesivo o continuado puede dar lugar a una congestión nasal de rebote provocada por el propio medicamento.

Intoxicación y su Tratamiento

Con dosis elevadas o en caso de ingestión accidental, pueden presentarse signos de absorción sistémica: dolores de cabeza, temblores, insomnio, sudoración excesiva, palpitaciones del corazón, nerviosismo.

Acuda a un centro médico, indicando el producto y la cantidad ingerida.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Presentación

Envase con 10 ml de solución para pulverización nasal

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesite en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Mantenga Nebulicina® Adultos fuera del alcance y de la vista de los niños.

Sin receta médica

Boehringer Ingelheim España, S.A.
Prat de la Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Responsable de la fabricación:
Istituto De Angeli, S.r.l.
Località i Prulli
50066 Reggello (Firenze) Italia



La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.es/>.