



Phonal Comprimidos

COMPOSICIÓN

Por comprimido:

Neomicina (DCI) (sulfato)	2,5	mg
Polimixina B (DCI) (sulfato)	1000	UI
Bacitracina (DCI)	100	UI
Benzocaína (DCI)	1	mg

Excipientes:

Sacarosa	0,66	g
Sacarina sódica, fosfato sódico monobásico anhidro, celulosa microcristalina, estearato magnésico, polivinilpirrolidona K-30 y esencia de hierbabuena, c.s.		

PROPIEDADES

Phonal asocia a su composición una triada antibiótica que ejerce una rápida esterilización de la flora patógena bucal laringofaríngea y un anestésico, que produce alivio inmediato de la sensación dolorosa.



INDICACIONES

Prevención y tratamiento de procesos bacterianos y flogísticos buco-faríngeos. Laringitis. Afonía. Faringoamigdalitis. Infecciones superficiales de boca y garganta.



POSOLOGÍA

Un comprimido cada 2-3 horas, dejando desleír en la boca y sin masticar.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

ADVERTENCIAS

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene benzocaína, que puede establecer un resultado analítico de control de dopaje como positivo.

Advertencia sobre excipientes:

Este medicamento contiene 0,66 g de sacarosa por comprimido, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.

IMPORTANTE PARA LA MUJER:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.



**INCOMPATIBILIDADES**

No se han descrito.

INTERACCIONES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

No se han descrito.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro médico y/o consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

PRESENTACIÓN

Envase de 10 comprimidos.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A.

Avda. Gran Capità, 10
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

3389-01

