



## **DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal**

Lidocaina al 2%

### **COMPOSICIÓN**

Cada 100 g contiene: Lidocaina (D.C.I.), 2,0 g. Excipientes: Acido esteárico, Gliceril monoestearato, Glicerol, Trietanolamina, Oxido de zinc, Aceite de ricino sulfonado, Alcohol isopropílico, Perfume de rosa, Dioctilsulfosuccinato sódico, Dietilenglicol monoetil éter, Clorotimol, Agua desionizada, c.s

### **FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE**

Crema.

Contenido: 15 g y 30 g.

### **ACTIVIDAD**

*DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal tiene una actividad anestésica local de contacto.*

### **TITULAR Y FABRICANTE**

#### **Titular**

COMBE EUROPA, S.A.

C/ Orense, 58.

28020 Madrid.

#### **Fabricante**

INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A

Laguna, 66-68-70. Poligono Industrial Urtinsa II

(Alcorcón) - 28923 - España

### **INDICACIONES**

**DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal** está indicado para el alivio sintomático temporal y local del picor leve de la zona vaginal externa, como el debido a reacciones a ropa interior, jabones o desodorantes.

### **CONTRAINDICACIONES**

**DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal** está contraindicado en pacientes que previamente hayan mostrado reacción de hipersensibilidad a la Lidocaina o a cualquier componente de la formulación. Menores de 3 años.

### **PRECAUCIONES**

Sólo para uso cutáneo vaginal externo. No emplear sobre áreas extensas.

Evitar su aplicación sobre piel herida, erosionada, sangrante o con ampollas.

Evitar el contacto con los ojos.

No debe utilizarse durante más de 7 días, salvo indicación del médico. En caso de agravación o persistencia de los síntomas o si aparece enrojecimiento, dolor o inflamación, interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se han descrito.

### ADVERTENCIAS

**Embarazo y lactancia:** en caso de embarazo o lactancia, se debe consultar al médico antes de utilizar este medicamento.

**Uso en niños:** no se debe utilizar en niñas menores de 12 años.

**Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** no se han descrito.

**Uso en deportistas:** Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de Control de dopaje como positivo.

### POSOLOGÍA

Uso cutáneo sobre la zona vaginal externa.

**Adultos y niñas mayores de 12 años:** aplicar una pequeña cantidad sobre la zona afectada hasta un máximo de 3-4 veces al día.

### *NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO*

Aplicar una fina capa de crema y extenderla suavemente sobre la zona externa vaginal afectada.

### SOBREDOSIS

Es muy poco probable una intoxicación con **DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal**, dada su forma de presentación y administración. No obstante, si por aplicación masiva o por ingestión accidental se produjese irritación, mareos, molestias gástricas, ansiedad, nerviosismo, somnolencia u otros síntomas, acudir a un centro médico o consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida o aplicada.

### REACCIONES ADVERSAS

Raramente, en algunas personas sensibles pueden producirse irritación, escozor, edema (hinchazón producida por retención de líquidos) o reacción alérgica en la zona de aplicación.

Si se observan éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

### CONSERVACIÓN

Condiciones normales de conservación.

### CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TEXTO REVISADO

Octubre de 1.999.

**DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal**

Lidocaina al 2%

**COMPOSICIÓN**

Cada 100 g contiene: Lidocaina (D.C.I.), 2,0 g. Excipientes: Acido esteárico, Gliceril monoestearato, Glicerol, Trietanolamina, Oxido de zinc, Aceite de ricino sulfonado, Alcohol isopropílico, Perfume de rosa, Dioctilsulfosuccinato sódico, Dietilenglicol monoetil éter, Clorotimol, Agua desionizada, c.s

**FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE**

Crema.

Contenido: 15 g y 30 g.

**ACTIVIDAD**

*DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal tiene una actividad anestésica local de contacto.*

**TITULAR Y FABRICANTE****Titular**

COMBE EUROPA, S.A.

C/ Orense, 58.

28020 Madrid.

**Fabricante**

ALCALA FARMA, S.L.

Carretera M-300 Km 29,920 (Alcalá de Henares)

- 28802 - España

**INDICACIONES**

**DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal** está indicado para el alivio sintomático temporal y local del picor leve de la zona vaginal externa, como el debido a reacciones a ropa interior, jabones o desodorantes.

**CONTRAINDICACIONES**

**DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal** está contraindicado en pacientes que previamente hayan mostrado reacción de hipersensibilidad a la Lidocaina o a cualquier componente de la formulación.  
Menores de 3 años.

**PRECAUCIONES**

Sólo para uso cutáneo vaginal externo. No emplear sobre áreas extensas.  
Evitar su aplicación sobre piel herida, erosionada, sangrante o con ampollas.  
Evitar el contacto con los ojos.  
No debe utilizarse durante más de 7 días, salvo indicación del médico. En caso de agravación o persistencia de los síntomas o si aparece enrojecimiento, dolor o inflamación, interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se han descrito.

## ADVERTENCIAS

**Embarazo y lactancia:** en caso de embarazo o lactancia, se debe consultar al médico antes de utilizar este medicamento.

**Uso en niños:** no se debe utilizar en niñas menores de 12 años.

**Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** no se han descrito.

**Uso en deportistas:** Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de Control de dopaje como positivo.

## POSOLOGÍA

Uso cutáneo sobre la zona vaginal externa.

**Adultos y niñas mayores de 12 años:** aplicar una pequeña cantidad sobre la zona afectada hasta un máximo de 3-4 veces al día.

## *NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO*

Aplicar una fina capa de crema y extenderla suavemente sobre la zona externa vaginal afectada.

## SOBREDOSIS

Es muy poco probable una intoxicación con **DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal**, dada su forma de presentación y administración. No obstante, si por aplicación masiva o por ingestión accidental se produjese irritación, mareos, molestias gástricas, ansiedad, nerviosismo, somnolencia u otros síntomas, acudir a un centro médico o consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida o aplicada.

## REACCIONES ADVERSAS

Raramente, en algunas personas sensibles pueden producirse irritación, escozor, edema (hinchazón producida por retención de líquidos) o reacción alérgica en la zona de aplicación.

Si se observan éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

## CONSERVACIÓN

Condiciones normales de conservación.

## CADUCIDAD



Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

TEXTO REVISADO

Octubre de 1.999.