

Actividad: Antiséptico tópico vaginal.
Indicaciones: Lavado desinfectante de la zona vaginal externa. Alivio de los síntomas asociados a infecciones vaginales. Contraindicaciones: Intolerancia al yodo y sus derivados.
Precauciones: Uso externo. No ingerir. Evitar contacto con los ojos, oídos y otras mucosas. Consulte con su médico si persisten o se agravan los síntomas.
Interacciones: No utilizar con derivados mercuriales. Advertencia: Embarazo y lactancia: Evítese su uso continuado.
Efectos sobre la capacidad de conducción: No se han descrito.
Posología e instrucciones de empleo: Lavar con una dilución de 2 tapones rasos de producto por litro de agua hervida y tibia. Sobredosis: En caso de ingestión accidental, acudir a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: (91) 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida. Reacciones adversas: En los raros casos en los que se produzca irritación en la piel o alergia, suspender el tratamiento y lavar la zona afectada con agua. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte con su médico o farmacéutico. Caducidad: Este medicamento no debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Texto revisado: Junio de 2006

MANTENGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS
SIN RECETA MÉDICA 09469.5

997429-EFP

Betadine[®] VAGINAL

Povidona iodada 125 ml
Solución concentrada

VIA TÓPICA VAGINAL USO EXTERNO-
NO INGERIR

Composición por 100 ml: Povidona
iodada 10 g, nonoxinol-9, bouquet
fleurona, agua, c.s.

MEDA Pharma SAU
Av. Castilla, 2 (P.E. San Fernando)
28830 S. Fdo. De Henares (Madrid)
Fabricante: Meda Manufacturing,
Burdeos (Francia)
Licencia MUNDIPHARMA AG. Suiza