

PROSPECTO**MICRALAX citrato/lauril sulfato 450mg/45mg solución rectal****COMPOSICIÓN**

Por cánula:

Citrato trisódico dihidrato	450 mg
Lauril sulfoacetato sódico	45 mg

Excipientes: Glicerol, Ácido sórbico, Sorbitol, Agua purificada, c.s.p. 5 ml

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Emulsión rectal de consistencia viscosa en envases conteniendo 4 y 12 cánulas.

ACTIVIDAD

Laxante por vía rectal.

TITULAR Y FABRICANTE**Titular:**

Johnson & Johnson S.A.
Paseo de las Doce Estrellas, 5-7
28042-Madrid

Responsable de la fabricación:

Famar Orléans
5, Avenue de Concyr
45071 Orleans Cedex 2,(Francia)

INDICACIONES

Para el alivio local sintomático del estreñimiento transitorio y ocasional. Adultos y niños mayores de 12 años.

CONTRAINDICACIONES

Crisis hemorroidal aguda. Colitis hemorrágica.
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

PRECAUCIONES

Evitar su uso crónico; para utilizarlo durante más de 6 días, consultar al médico. Si aparecen hemorragia, dolor o escozor anal, interrumpir su uso y consultar al médico.

INTERACCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS**Embarazo y lactancia****IMPORTANTE PARA LA MUJER**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto.

Uso en niños

No utilizar en menores de 12 años sin consultar al médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción

No se han descrito.

POSOLOGÍA**Adultos y niños mayores de doce años.**

Administrar el contenido de la cánula por vía rectal, insertando la longitud total de la cánula. No es necesaria la utilización de un lubricante, ya que una gota de la mezcla es suficiente.

Niños menores de doce años.

Consultar al médico.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

En el momento elegido para la deposición, y una vez quitado el capuchón que cierra el extremo de la cánula, colóquese ésta en posición vertical con la punta hacia arriba y oprímase ligeramente para que unas gotas de Micralax citrato/lauril sulfato humedezcan el extremo de la misma, con objeto de facilitar su introducción en el recto. Una vez introducida en el recto, apretar el envase hasta vaciar totalmente el contenido de la cánula y retirarla suavemente sin dejar de presionar sobre sus paredes.

SOBREDOSIS

Aunque no es de esperar tras la administración por vía rectal, en el caso de que aparecieran algunos síntomas de sobredosificación como pueden ser diarrea y pérdida de fluidos, deberá interrumpirse su utilización y consultar con el médico para que instaure un tratamiento sintomático.

En caso de ingestión accidental, acudir al centro médico más cercano o llamar al Servicio de Información Toxicológica - teléfono 91 562 04 20 - indicando el producto y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente, dolor, irritación, escozor, picor anal. Si se produce cualquier reacción adversa atribuible a la utilización del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.


CONSERVACIÓN

No requiere condiciones especiales de conservación.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto Sigre  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

SIN RECETA MÉDICA

TEXTO REVISADO: Junio 1996

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>